



Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022

Henrik Brøseth
John Odden
Erlend B. Nilsen

NINAs publikasjoner

NINA Rapport

Dette NINAs normale rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig.

NINA Temahefte

Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport.

NINA Fakta

Faktaarkene har som mål å gjøre NINAs forskningsresultater raskt og enkelt tilgjengelig for et større publikum. De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste forskningstema.

Annen publisering

I tillegg til rapporteringen i NINAs egne serier publiserer instituttets ansatte en stor del av sine vitenskapelige resultater i internasjonale journaler, populærfaglige bøker og tidsskrifter.

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022

Henrik Brøseth
John Odden
Erlend B. Nilsen

Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2022. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022. - NINA Rapport 2155. Norsk institutt for naturforskning.

Trondheim, juni 2022

ISSN: 1504-3312

ISBN: 978-82-426-4948-5

RETTIGHETSHAVER

© Norsk institutt for naturforskning

Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse

TILGJENGELIGHET

Åpen

PUBLISERINGSTYPE

Digitalt dokument (pdf)

KVALITETSSIKRET AV

Neri H. Thorsen

ANSVARLIG SIGNATUR

Jonas Kindberg

OPPDRAGSGIVER

Miljødirektoratet

OPPDRAGSGIVERS REFERANSE

M-2313 I 2022

KONTAKTPERSON HOS OPPDRAGSGIVER

Susanne Hanssen

NØKKELOD

Gaupe, *Lynx lynx*, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling

KEY WORDS

Eurasian lynx, *Lynx lynx*, monitoring, population trends

KONTAKTOPPLYSNINGER

NINA hovedkontor

Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim
Tlf: 73 80 14 00

NINA Oslo

Sognsveien 68
0855 Oslo
Tlf: 73 80 14 00

NINA Tromsø

Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø
Tlf: 77 75 04 00

NINA Lillehammer

Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer
Tlf: 73 80 14 00

NINA Bergen

Thormøhlensgate 55
5006 Bergen
Tlf: 73 80 14 00

www.nina.no

Sammendrag

Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2022. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022. - NINA Rapport 2155. Norsk institutt for naturforskning.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamerabilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning, der registreringene i all hovedsak blir gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

I 2022 er det estimert 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 343 dyr (95 % konfidensintervall (CI) = 284–403) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2022 og før reproduksjonssesongen, og er en nedgang fra i fjor. Gaupebestanden ligger under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger.

Fire av sju forvaltningsregioner med mål om yngling av gaupe ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2022. Dette er regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland), 5 (Hedmark) og 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under de regionale bestandsmålene. Når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over det regionale bestandsmålet.

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 63 (75 % CI = 55–78) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2023.

Henrik Brøseth, John Odden & Erlend B. Nilsen, Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim. henrik.broseth@nina.no

Abstract

Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E. B. 2022. Number of family groups, population estimate and population development of lynx in Norway for 2022. - NINA Report 2155. Norwegian Institute for Nature Research

The national monitoring program for large carnivores follows the Norwegian lynx population through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups from snow tracking, observations and dead kittens. The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia.

In 2022 a total of 58,5 family groups were documented, which correspond to a total population size of approximately 343 (confidence interval (CI) = 284–403) lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to hunting in 2022, and is a decline since last year. The lynx population is below the national management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004.

Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold), 3 (Oppland), 5 (Hedmark) and 6 (Møre and Romsdal and Trøndelag) is at or above the regional management goal in 2020. When looking at the average number of family groups the last three years, only region 2, 3 and 6 have achieved their regional management goal. Based on a prognosis model we predict that the population will be at 63 family groups (75 % CI = 55–78) before hunting starts in 2023.

Henrik Brøseth, John Odden & Erlend B. Nilsen, Norwegian Institute for Nature Research, P.O. Box 5685 Torgarden, NO-7485 Trondheim, Norway. henrik.broseth@nina.no

Innhold

Sammendrag	3
Abstract	4
Innhold	5
Forord	6
1 Innledning	7
2 Materiale og metoder	7
2.1 Datamaterialet.....	7
2.2 Avstandsregler.....	8
2.3 Prognosemodell.....	10
2.4 Søk etter familiegrupper i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund.....	10
3 Resultater	12
3.1 Antall familiegrupper før jakt.....	12
3.2 Bestandsestimat basert på antall familiegrupper før jakt.....	14
3.3 Bestandsutviklingen i ulike forvaltningsregioner.....	14
3.4 Nasjonale og regionale prognoser.....	17
4 Diskusjon	20
5 Referanser	22
6 Vedlegg	23
6.1 Vedlegg 1.....	23
6.2 Vedlegg 2.....	24

Forord

En nasjonal bestandsovervåking av gaupe lar seg ikke gjennomføre uten et stort støtteapparat. Det aller meste av registreringsarbeidet er gjort av lokale folk på frivillig basis. En lang rekke privatpersoner, ulike organisasjoner og lag har bidratt i arbeidet med registrering av familiegrupper av gaupe i vinter. Vi vil her benytte sjansen til å takke alle de som har bidratt til bestands- overvåkingen av familiegrupper av gaupe på landsbasis. Det gjelder både de som har rapportert inn og de som har foretatt kvalitetssikringen av arbeidet i Statens naturoppsyn (SNO). Stor takk også til Scandcam (viltkamera.nina.no) og våre samarbeidspartnere i det svenske overvåkings- systemet (Naturvårdsverket, Länsstyrelsene og Viltskadecenter).

Trondheim, juni 2022

Henrik Brøseth

1 Innledning

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom registrering av familiegupper (hunndyr i følge med årsunger). Ved bruk av såkalte avstandsregler beregnes antall ulike familiegupper av gaupe før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Observasjoner gjort av lokale folk akkumuleres gjennom sesongen på snøføre, og rapporteres inn til Statens naturoppsyn (SNO), og gjennom en åpen publikumsløsning på internett (www.skandobs.no). På bakgrunn av beregnet antall familiegupper estimeres den totale bestandsstørrelsen av gaupe før jakt. I denne rapporten presenterer vi resultatene over antall familiegupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakta i 2022. Overvåkingsresultatene i 2022 vurderes opp imot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996–2021 (<https://rovdata.no/Gaupe/Rapporter.aspx>).

Siden vinteren 2013/14 er overvåkingsarbeidet rundt gaupe i Skandinavia samordnet med tanke på overvåkingsmetodikk, kvalitetssikring, datalagring og felles rapportering (Brøseth & Tovmo 2013, Kjørstad mfl. 2012). Endringene i overvåkingsmetodikken kan medføre at det blir noe større usikkerhet i tolkningen av bestandsendringene som observeres etter en slik omlegging sammenlignet med tidligere år, men de observerte endringene etter omleggingen er direkte sammenlignbare med hverandre.

2 Materiale og metoder

Registreringer av meldinger om familiegupper av gaupe blir i hovedsak kanalisert via lokale rovviltkontakter til en regionalt rovviltansvarlig hos Statens naturoppsyn (SNO). Basert på kvalitetssikringen som gjøres av SNO kategoriseres dataene som «Dokumentert», «Antatt sikker», «Usikker», «Feilmelding» eller «Kan ikke vurderes», før de legges inn i det sentrale database-systemet til rovviltforvaltningen (Rovbase 3.0) for ivaretagelse.

2.1 Datamaterialet

Datamaterialet benyttet i denne rapporten er innhentet ved at regionalt rovviltansvarlige hos SNO har godkjent og kvittert ut alle rovviltobservasjoner som gjelder familiegupper av gaupe i perioden 1. oktober 2021 til 28. februar 2022. Alle disse rovviltobservasjonene er så kvalitetssikret av Rovdata i regi nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Data fra Rovbase 3.0 som er benyttet i denne rapporten, er hentet ut den 16. mai 2022 (**tabell 1** og **vedlegg 1**). Totalt er det i år gjennomgått 364 registrerte saker, hvorav 238 er familieguppeobservasjoner med status «Dokumentert» eller «Antatt sikker» (**vedlegg 2**). I alt 98 av sakene er blitt innmeldt gjennom den åpne publikumsløsningen Skandobs på internett (www.skandobs.no), hvorav 54 har status «Dokumentert» eller «Antatt sikker».

Grunnlagsdataene for analysene består av spor- og synsobservasjoner av familiegupper som er klassifisert i kategoriene «Dokumentert» eller «Antatt sikker». Det er brukt data i perioden fra og med 1. oktober til og med 28./29. februar. Årsaken til at vi ikke bruker observasjoner gjort senere enn 28./29. februar i analysene, er for å forhindre en «overtelling» av familiegupper ved at to gauper som ikke er mor og avkom går sammen. Brunsten hos gaupa er i mars. Hanngaupene oppsøker da ofte flere ulike hunngauper. Hannen kan da gå sammen med hunnen i flere dager, og flere hanner kan samles rundt en hunn. Vi gjør oppmerksom på at det fram til og med 2005 kun ble benyttet observasjoner fram til 15. februar. Registreringsperioden ble utvidet på bakgrunn av nye data fra det Skandinaviske gaupeprosjektet, Scandlynx (www.scandlynx.nina.no). Familiegupper påvist ved bruk av viltkamera fra forskningsprosjektet

Scandcam (viltkamera.nina.no) er lagt inn som ordinære roviltobservasjoner i Rovbase, og er inkludert i datagrunnlaget.

I tillegg til observasjoner av familiegrupper er det i datagrunnlaget tatt inn 9 døde unger i perioden fra og med 1. oktober 2021 til og med 31. mars 2022. Disse dataene er hentet ut fra Rovbase 3.0 hvor all kjent avgang (kvotejakt, trafikk, osv.) av gaupe registreres. Dataene er sjekket opp mot aldersavlesningen på det som er innlevert som jakt og fallviltmateriale hos NINA.

Tabell 1. Oversikt over rådatamaterialet av familiegruppeobservasjoner (sporobservasjon, foto, eller døde unger) som danner grunnlaget for beregning av antall familiegrupper og bestandsestimater i 2022. En detaljert oversikt over materialet er gitt i **vedlegg 1**.

Rovviltregion	Sporobservasjoner	Synsobservasjoner (viltkamera)	Døde unger
1 - Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder	0	0	0
2 - Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold	29	11	1
3 - Oppland	34	9	0
4 - Østfold, Oslo og Akershus	10	1	1
5 - Hedmark	45	6	0
6 - Møre og Romsdal og Trøndelag	27	11	7
7 - Nordland	16	3	0
8 - Troms og Finnmark	26	8	0
SUM	187	49	9


2.2 Avstandsregler

Overvåkingen av gaupe beregner antall familiegrupper i Norge før jakt. Til dette er det utviklet avstandsregler for å skille observasjoner av ulike familiegrupper fra hverandre. Ut fra analyser av forflytning og hva som best forklarer variasjonen i forflytningsavstand hos hunngauper er Skandinavia delt inn i fire ulike byttedyrkategorier: 1–nordlige tamreinområder, 2–sørlige tamreinområder, 3–områder med «lav» tetthet av byttedyr og 4–områder med «høy» tetthet av byttedyr (**Figur 1**) (Gervasi mfl. 2013).

Lengden på avstandsreglene varierer med antall døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske avstandsreglene tar utgangspunkt i den maksimale avstanden (i luftlinje) som hunngauper forflytter seg fra en dag til de ti påfølgende dagene. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et hjemmeområde for en hunngaube med unger. En detaljert beskrivelse vedrørende beregning og bruk av avstandsreglene finnes i Gervasi mfl. (2013), Linnell mfl. (2007) og i Faktablad Lodjur: Avståndskriterier (rovdata.no og Brøseth & Tovmo 2013). Familiegrupper av gaupe kan ha leveområder som omfatter arealer på begge sider av region- eller landegrenser. Kriteriene for deling av en familiegruppe mellom regioner eller land er beskrevet i Faktablad Lodjur: Avståndskriterier (Brøseth & Tovmo 2013).

For å beregne antallet gauper i Norge før jakt tar vi utgangspunkt i beregningen av antall familiegrupper. Basert på antall familiegrupper og omregningsfaktorer estimeres den totale bestandsstørrelsen av gaupe før jakt. Omregningsfaktoren varierer med tetthet av byttedyr i ulike områder (**Figur 1**), og angir hvor stor andel av den totale gaupebestanden i området som består av familiegrupper. Dess mindre andel av bestanden som består av familiegrupper, dess høyere er om-

regningsfaktoren. For mer detaljert informasjon omkring beregningen av disse omregningsfaktorene henvises til arbeidet av Andrén mfl. (2002). Omregningsfaktoren for lav byttedyrtetthet er benyttet i de nordlige tamreinområdene.



Figur 1. Lengden på avstandsreglene og omregningsfaktorene som brukes varierer med tettheten av store byttedyr (Gervasi mfl. 2013). Skandinavia er delt inn i fire kategorier; 1–nordlige tamreinområder, 2–sørlige tamreinområder, 3–områder med «lav» tetthet av byttedyr og 4–områder med «høy» tetthet av byttedyr.

2.3 Prognosemodell

En av utfordringene i forvaltningen av gaupebestanden har vært at man er nødt til å ta utgangspunkt i fjorårets familiegruppetellinger når årets kvoter skal fastsettes. Tidsforsinkelsen skyldes at årets tellinger av antall familiegrupper ikke er ferdig før jakta begynner. Dette har blitt utpekt som en av de større utfordringene med å nå bestandsmålene i forvaltningen av gaupe i Norge. I 2011 ble det utarbeidet en prognosemodell for utviklingen av gaupebestanden i Norge som tar utgangspunkt i tellingene av familiegrupper og kjent uttak av gauper, for å estimere antall familiegrupper før jakt til neste år (Nilsen mfl. 2011). Hensikten med en slik prognosemodell er å gi et formalisert og robust prognoseverktøy som skal hjelpe beslutningstakere å forutsi bestandsstørrelsen av gaupe ett år fram i tid. Basert på de nye tallene for bestandsstatus gitt i denne rapporten og kjent avgang av voksne hunngauper presenteres en prognose på antall familiegrupper før jakt i 2023, både på landsbasis og for den enkelte rovviltregion. Prognose tallene som oppgis i denne rapporten er basert på «Modell 4» fra Nilsen mfl. (2011), dvs. modellering med informativ prior og uttak i form av voksne hunngauper.

2.4 Søk etter familiegrupper i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund


Siden 2004 har det i deler av landet, i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), vært gjennomført gaupetaksering hver vinter før gaupejakta. Det ble benyttet et fast nettverk av takseringslinjer for å følge utviklingen i gaupebestanden over tid, gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene («gaupeindeks»). I 2014 ble det gjennomført en evaluering av linjetakseringen som konkluderte med at systemet med takseringslinjer ikke hadde fungert etter hensikten. Fra evalueringen anbefalte man at det ble designet et nytt system som fokuserte på å registrere familiegrupper av gaupe (Mattisson mfl. 2014).

I henhold til det nye systemet har NJFF fra og med registreringssesongen 2014/2015 gjennomført systematiske sporsøk etter familiegrupper av gaupe i registreringsperioden for gaupe (1. oktober – 28./29. februar). Søkeområdet er hele landet, men er begrenset til områder med fast forekomst av gaupe. Det skal utføres minimum 10 km sporingsarbeid per kvadratmil egnet habitat (100 km²), noe som gir minimum sporingsinnsats per sesong på omtrent 6700 km (**tabell 2**). Alle registreringer av familiegrupper av gaupe skal meldes direkte til SNO, og også legges inn i Skandobs på internett (www.skandobs.no).

Registreringssesongen 2021/2022 ble det registrert i underkant av 9000 km sporingsarbeid utført av NJFF (**tabell 2** og **figur 2**). NJFF registrerte 43 observasjoner av familiegrupper i Skandobs. Av disse ble 33 poster vurdert som «Dokumentert» eller «Antatt sikker» observasjon av familiegruppe i Rovbase. De resterende observasjonene er enten saker som ikke lot seg kontrollere (synsobservasjoner eller på grunn av værforhold), viste seg å være enkeltdyr eller andre arter, eller en familiegruppe som allerede var godt kjent for SNO og ressurser ble prioritert for kontroll av andre observasjoner.

Tabell 2. Oversikt over minimum og gjennomført antall km sporingsinnsats registreringsseongen 2021/2022 fordelt per region (fylkesinndeling 2017), og antall innmeldte observasjoner av familiegrupper i Skandobs fra NJFF personell, samt antall observasjoner fra NJFF personell som er kvalitetssikret og godkjent av SNO.

Region	Minimumskrav (km)	Sporingsinnsats 2022 (km)	Antall observasjoner	Godkjente observasjoner
Finnmark	245	500	0	0
Troms	256	321	4	2
Nordland	498	622	3	3
Nord-Trøndelag	669	862	3	3
Sør-Trøndelag	417	183	4	2
Møre og Romsdal	212	111	1	0
Hedmark	1313	2022	10	8
Oppland	708	1996	10	9
Buskerud	618	0	0	0
Telemark	636	1083	5	4
Vestfold	139	0	1	1
Aust-Agder	424	206	1	0
Vest-Agder	21	5	0	0
Oslo/Akershus	350	543	1	1
Østfold	258	243	0	0
Totalt	6764	8697	43	33




Figur 2. Sporingsinnsats gjennomført av NJFF registreringsseongen 2021/2022.


3 Resultater

3.1 Antall familiegrupper før jakt

Før gaupejakta i 2022 er det estimert 58,5 familiegrupper på landsbasis (**figur 3**), dette er færre enn i 2021 (67 familiegrupper). Antall familiegrupper av gaupe før jakt i perioden 1996 til 2022 er vist i **figur 4**. Gaupebestanden er lavere enn det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe.




Figur 3. Kart som viser antall familiegrupper på landsbasis i 2022.



Figur 4. Antall familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakt i perioden 1996–2022. Den stippledde linjen angir det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper. Antall familiegrupper i 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.

3.2 Bestandsestimat basert på antall familiegrupper før jakt

I 2022 er det estimert 343 (95 % CI = 248–403, **figur 5**) gauper på landsbasis. Dette er estimatet på bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2022 og før reproduksjonssesongen. Bestandsestimatet før jakt i 2022 viser færre gauper på landsbasis sammenlignet med 2021.



Figur 5. Estimert bestandsstørrelse av gaupe på landsbasis før jakt i perioden 1996–2022. Bestandsestimatet for 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.

3.3 Bestandsutviklingen i ulike forvaltningsregioner

For å analysere bestandsutviklingen i antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996–2022 har vi tatt utgangspunkt i de 8 forvaltningsregionene for rovvilt som ble vedtatt i den siste Stortingsmeldingen (St.meld. nr. 15 (2003–2004) «Rovvilt i norsk natur», Innst. S.nr. 174) (**figur 6**). Antall familiegrupper i de ulike regionene i perioden 2011–2022 er gitt i **tabell 3** og **4**. I regionene 1, 4 og 8 er det ingen endringer sammenlignet med 2021. I regionene 2, 6 og 7 er det registrert en nedgang, mens i regionene 3 og 5 er det en økning sammenlignet med 2021.

Av regionene med fastsatte bestandsmål ligger region 2, 3, 5 og 6 på eller over det regionale bestandsmålet i antall påviste familiegrupper i 2021. Det er første gang siden 2011 at Region 5 er over bestandsmålet. Regner man gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over bestandsmålet (**tabell 3**).

Tabell 3. Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt i ulike forvaltningsregioner fra 2020 til 2022, samt gjennomsnittet for de tre årene.

Forvaltnings-region	Nasjonalt bestandsmål	2020 ¹	2021 ²	2022 ³	Gjennomsnitt
1	–	0	0	0	0
2	12	16	15,5	12	14,5
3	5	5	6	7	6
4	6	0,5	3	3	2,2
5	10	8	8,5	10,5	9
6	12	15	18	14	15,7
7	10	11	10	6	9
8*	10(4)	11(3)	6(2)	6(0)	7,7
Sum	65	66,5	67	58,5	64

*Tallene i parentes angir familiegrupper i Finnmark fylke.

¹ 2020

Region 6 deler en yngling av gaupe med region 7. Denne er delt mellom regionene.

Region 4, 6 og 7 deler alle en yngling med Sverige. Disse er delt mellom landene.

Region 8 deler en yngling med Finland. Denne regnes som 1 i Norge.

² 2021

Region 2 deler en yngling med region 3. Denne er delt mellom regionene.

Region 5 deler en yngling med region 3 og en yngling med region 4. Disse er delt mellom regionene.

Region 7 deler to ynglinger med Sverige. Region 4 og 5 deler en yngling med Sverige. Alle disse er delt mellom landene.

³ 2022


Region 4 deler to ynglinger med region 5. Disse er delt mellom regionene.

Region 4 deler to ynglinger med Sverige og Region 5 deler en yngling med Sverige. Alle disse er delt mellom landene.

Tabell 4. Antall familiegrupper av gaupe før jakt i ulike rovviltregioner i perioden 2011–2022.

Region/ År	2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	16	16,5	16,5	16	9,5	9	15	15	16	15,5	12
3	5,5	7,5	5,5	7	3,5	5	6	7	5	6	7
4	5	1	5	4,5	1,5	1,5	1,25	1	0,5	3	3
5	6,5	5	4,5	2,5	7,5	9,5	7,25	6	8	8,5	10,5
6	14	8	12,5	17	14,5	18,5	15,5	15,5	15	18	14
7	8	10	4	5,5	6,5	6	8,5	5,5	11	10	6
8	13	10	5,5	8	9	6	4	5	11	6	6
SUM	69	59	53,5	60,5	52	55,5	57,5	55	66,5	67	58,5


*Tallene for 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.



Figur 6. Forvaltningsregionene og fordelingen av familiegruppene i 2022. Familiegrupper i områder med «lav» tetthet av byttedyr og i nordlige tamreinområder er angitt med store sirkler, familiegrupper i sørlige tamreinområder har mellomstore sirkler, og familiegrupper i områder med «høy» tetthet av byttedyr har små sirkler. Arealet av sirklene tilsvarer gjennomsnittlige leveområder i de ulike byttedyrkategoriene.

3.4 Nasjonale og regionale prognoser

Uttaket av gauper fra bestanden i Norge vinteren 2021/2022 var på 67 individer (**figur 7**), hvorav 25 var voksne hunngauper.




Figur 7. Antall familiegupper av gaupe (sirkler) og uttak av gauper (stolpediagram) i Norge i perioden 1996–2022. Antall familiegupper i 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.

Basert på antall familiegupper påvist før jakt i 2022 og kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år), gir prognosemodellen et estimat på 63 (75 % CI = 55–78) familiegupper før jakt på landsbasis i 2023 (**tabell 5, figur 8**). Prognosemodellen viser at det er 60 % sannsynlighet for at gaupebestanden skal havne under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegupper før jakt i 2023.

De regionale prognosene tyder på at rovviltregion 4, 7 og 8 har stor sannsynlighet for å ligge under bestandsmålet også før jakta i 2023 (**tabell 6**). Vi understreker at det er stor usikkerhet i de regionale prognosene da det her er snakk om små tall og vide konfidensintervaller (Krange mfl. 2016, Nilsen mfl. 2011).

Tabell 5. Prognose for antall familiegrupper i Norge i 2023 (FG_{2023} , med 75 % usikkerhetsintervaller). Det er også beregnet sannsynlighet for at antall familiegrupper i 2023 vil være lavere enn det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

	Bestandsmål	Antall familiegrupper av gaupe påvist i 2022	Prognose for antall familiegrupper (FG_{2022}) [75 % CI]	Sannsynlighet for at $FG_{2022} < 65$
Norge	65	58,5	63 [55–71]	60 %




Figur 8. Utviklingen i gaupebestanden i perioden fra 1996 til 2022, samt modellprognoser for 2023 basert på informasjonen som er tilgjengelig i etterkant av jakta i 2022. Den stiplede linjen angir det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Tabell 6. Prognose over antall familiegrupper i 2023 (FG_{2023} , med 75 % usikkerhetsintervaller) for de ulike rovviltregionene med bestandsmål, samt sannsynligheten for at antall familiegrupper i 2023 vil være mindre enn de regionale bestandsmålene. Prognosene er gitt på bakgrunn av informasjonen som er tilgjengelig i etterkant av kvotejakta i 2022.

Region	Regionalt bestandsmål	Antall familiegrupper av gaupe påvist i 2022	Prognose for antall familiegrupper i 2023 (FG_{2023}) [75 % CI]	Sannsynlighet for at $FG_{2023} <$ bestandsmålet
2	12	12	12,1 [9,0–15,8]	48 %
3	5	7	7,3 [5,2–9,8]	10 %
4	6	3	2,6 [1,1–4,8]	95 %
5	10	10,5	11,7 [8,6–15,1]	28 %
6	12	14	11,3 [7,6–15,6]	58 %
7	10	6	9,0 [6,0–12,1]	65 %
8	10	6	8,1 [5,1–11,4]	75 %

4 Diskusjon

Antall familiegrupper ligger under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper. Region 2 (Sør-Norge), region 3 (Oppland), region 5 (Hedmark) og region 6 (Midt-Norge) ligger alle over det regionale bestandsmålet i 2022, mens regionene 4, 7 og 8 ligger under. De nasjonale prognosene viser at det mest sannsynlige scenarionet er at antall familiegrupper vil ligge under bestandsmålet også før jakt i 2023 (63 familiegrupper). Forskning viser at kvotejakt er den klart viktigste dødsårsaken til gauper i Norge (Andrén mfl. 2006). De siste to tiårene har uttaket av voksne hunndyr ligget på mellom 12 og 51 årlig. Gitt en bestandsstørrelse i 2023 på 63 familiegrupper viser beregninger med prognosemodellen at et uttak i jakta i 2023 på mer enn 30 voksne hunngauper med stor sannsynlighet vil føre til at bestanden havner under det nasjonale bestandsmålet i 2024 (**figur 9**). Vi understreker at disse prognosene er heftet med usikkerhet.



Figur 9. Prognose for antall familiegrupper på landsbasis før jakta i 2023 gitt tre ulike scenarier for uttak av voksne hunndyr under jakta i 2023 (henholdsvis 15, 30 og 45 voksne hunndyr). Sannsynligheten for å falle under bestandsmålet på 65 familiegrupper er hhv 34 %, 67 % og 90 % for de tre scenarioene. Punkttestimatene (sort prikk) er hhv 69, 61 og 53 familiegrupper. Oransje strek angir 50 % CI og grå strek angir 75 % CI. Stiplet horisontal linje angir bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Regionalt ser vi at det både er rovviltregioner som ligger over og under de regionale bestandsmålne, og dette illustrerer kanskje noe av utfordringene de regionale forvalterne har ved å holde antall familiegrupper stabilt rundt måltallet. Spesielt utfordrende kan dette synes å være i regioner med en liten bestand og et lite måltall (Krange mfl. 2016). Dette reflekteres i usikkerheten i de regionale prognosene, jo mindre regionene blir i antall familiegrupper, jo større blir usikkerhetene i estimatene. Små bestander er sterkt påvirket av tilfeldig variasjon i demografi. I tolkningen av overvåkingsresultatene må man være klar over at andelen voksne hunngauper som får fram unger som er i live den første vinteren kan variere en del mellom år og områder. I enkelte år vil en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som klarer det (Nilsen mfl. 2012, Walton mfl. 2017).

Våre beregninger av antall familiegrupper påvirkes av ulike feilkilder. Metoden med akkumulering av observasjoner gjennom hele vinteren, og bruk av avstandsregler til å skille familiegruppene fra hverandre, kan i enkelte tilfeller føre til at to familiegrupper feilaktig blir klassifisert som en. Simuleringer viser at sannsynligheten for underestimert vil være høyere i tette bestander der hver hunngaube med unge har flere naboer som reproducerer (Gervasi mfl. 2013). Studier av radiomerkede gauper viser også at hunngauper med unger i enkelte tilfeller kan ta seg «ekskursjoner» bort fra sitt normale revir, og dermed feilaktig bli klassifisert som to. Data fra Scandlynx viser også at revirstørrelsene kan øke når tettheten av gaupe reduseres (Aronsson mfl. 2016), noe som i enkelte tilfeller kan føre til en overestimert av antall familiegrupper. Metoden med akkumulering av observasjoner gjennom vinteren vil i tillegg være avhengig av snøforhold og rapporteringsvilligheten til allmennheten, noe som også kan tenkes å variere mellom år og mellom områder. I de fleste deler av landet synes imidlertid SNO sitt nettverk av lokale rovviltkontakter å fange opp de aller fleste familiegruppene. I de senere år har det dessuten blitt gjennomført ekstra leteinnsats i regi av SNO, NJFF og forskningsprosjektet SCANDCAM som vinteren 2022 har hatt et nettverk av viltkamera i deler av rovviltregionene 2, 3, 4, 5 og 6. I tillegg har mange bidratt med bilder fra de mange private viltkameraene som står ute i store deler av Norge. Det er også en åpen publikumsløsning på internett for innmelding av rovviltobservasjoner (www.skandobs.no) som har bidratt til økt innmelding av gaupe familiegruppeobservasjoner fra publikum.

I deler av landet har NJFF tidligere hatt ansvar for å følge opp et nettverk av takseringslinjer, som skulle gås hver vinter før gaupejakta. Fra og med vinteren 2014/2015 har NJFF isteden gjennomført systematisk sporsøk etter familiegrupper av gaupe over hele landet i områder med fast forekomst av gaupe. Registreringssesongen 2021/2022 ble det sporet snaut 9000 km, noe som er over minimumskravet, men også i vinter er det i noen av fylkene sporet mindre enn minimumskravet. I enkelte regioner gjør NJFF et solid arbeid for å sikre leteinnsats der man har mistanke om familiegruppe av gaupe, mens i andre områder virker leteinnsatsen tilfeldig og flekkvis fordelt (**figur 4**). Vi anbefaler derfor at ordningen evalueres.

Slik som overvåkingen av gaupe er lagt opp i dag med årlige oppdateringer av antall familiegrupper på landsbasis og skandinavisk nivå, så lar dette seg ikke gjennomføre uten et stort støtteapparat. Det meste av registreringsarbeidet er gjort av lokale folk på frivillig basis, mens SNO har hatt ansvaret for kvalitetssikring av observasjonene gjennom sitt nettverk av lokale rovviltkontakter. Overvåkingen av familiegrupper av gaupe, fra registreringene i felt og fram til ferdig rapport, har, slik det er lagt opp i dag, et veldig stramt tidsskjema. Det er derfor viktig at alle ledd i overvåkingsarbeidet er seg dette bevisst for at vi skal kunne presentere oppdaterte bestandstall over familiegrupper av gaupe innenfor tidsfristen som er satt.

5 Referanser

- Andrén, H., Linnell, J.D.C., Liberg, O., Ahlqvist, P., Andersen, R., Danell, A., Franzen, R., Kvam, T., Odden, J. & Segerstrom, P. 2002. Estimating total lynx *Lynx lynx* population size from censuses of family groups. *Wildlife Biology* 8(4): 299-306.
- Andrén, H., Linnell, J.D.C., Liberg, O., Andersen, R., Danell, A., Karlsson, J., Odden, J., Moa, P.F., Ahlqvist, P., Kvam, T., Franzen, R. & Segerstrom, P. 2006. Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (*Lynx lynx*) in multi-use landscapes. *Biological Conservation* 131(1): 23-32. doi:10.1016/j.biocon.2006.01.025
- Aronsson, M., Low, M., Lopez-Bao, J.V., Persson, J., Odden, J., Linnell, J.D.C. & Andren, H. 2016. Intensity of space use reveals conditional sex-specific effects of prey and conspecific density on home range size. *Ecology and Evolution* 6(9): 2957-2967. doi:10.1002/ece3.2032
- Brøseth, H. & Tovmo, M. 2013. Antall familiegupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2013. NINA Rapport 960. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2358176>
- Gervasi, V., Odden, J., Linnell, J.D.C., Persson, J., Andrén, H. & Brøseth, H. 2013. Re-evaluation of distance criteria for classification of lynx family groups in Scandinavia. NINA rapport 965. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2375523>
- Kjørstad, M., Ledström, G., Nordin, H., Odden, J., Pedersen, V., Svensson, L. & Tovmo, M. 2012. Forslag til samordning av overvåking av gaupe i Norge og Sverige. NINA rapport 880. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2375570>
- Krange, O., Odden, J., Skogen, K., Linnell, J.D.C., Stokland, H.B., Vang, S. & Mattisson, J. 2016. Evaluering av regional rovviltforvaltning. NINA Rapport 1268. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2391094>
- Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén, H., Liberg, O., Andersen, R., Moa, P., Kvam, T., Brøseth, H., Segerstrom, P., Ahlqvist, P., Schmidt, K., Jedzejewski, W. & Okarma, H. 2007. Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx *Lynx lynx* family groups under different ecological conditions. *Wildlife Biology* 13(4): 447-455. doi:10.2981/0909-6396(2007)13[447:drfmco]2.0.co;2
- Mattisson, J., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2014. Evaluering av gauperegistrering i regi av NJFF. NINA Rapport 1069. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2375553>
- Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J., Andrén, H. & Linnell, J.D.C. 2011. Prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge. NINA Rapport 774. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2375639>
- Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C., Odden, J., Samelius, G. & Andren, H. 2012. Patterns of variation in reproductive parameters in Eurasian lynx (*Lynx lynx*). *Acta Theriologica* 57(3): 217-223. doi:10.1007/s13364-011-0066-5
- Walton, Z.A., Mattisson, J., Linnell, J.D., Stien, A. & Odden, J. 2017. The cost of migratory prey: seasonal changes in semi-domestic reindeer distribution influences breeding success of Eurasian lynx in northern Norway. *Oikos* 126(5): 642-650. doi:<http://dx.doi.org/10.1111/oik.03374>

6 Vedlegg


6.1 Vedlegg 1

Oversikt over materialet som danner grunnlaget for bestandsestimatene hos gaupe i 2021/2022. Kodene refererer til hvilke ID-nummer observasjonene har i forvaltningens databasesystem for rovviltinformasjon: Rovbase 3.0 (www.rovbase.no).

R536753, R536786, R536800, R536831, R536937, R537060, R537088, R537141, R537167, R537192, R537196, R537240, R537270, R537301, R537327, R537346, R537390, R537413, R537422, R537444, R537506, R537530, R537535, R537582, R537591, R537593, R537597, R537602, R537604, R537626, R537645, R537648, R537693, R537705, R537722, R537749, R537787, R537799, R537802, R537813, R537823, R537827, R537849, R537851, R537852, R537853, R537854, R537855, R537856, R537869, R537887, R537897, R537899, R537925, R537959, R537967, R537969, R538043, R538075, R538105, R538111, R538199, R538203, R538207, R538219, R538252, R538270, R538300, R538314, R538343, R538361, R538404, R538441, R538443, R538446, R538479, R538480, R538482, R538490, R538508, R538544, R538651, R538668, R538699, R538712, R538746, R538908, R538916, R538957, R538970, R538973, R538979, R539008, R539010, R539014, R539024, R539036, R539084, R539099, R539106, R539160, R539177, R539178, R539182, R539191, R539197, R539199, R539211, R539218, R539236, R539247, R539260, R539294, R539301, R539326, R539335, R539350, R539367, R539390, R539402, R539417, R539455, R539458, R539459, R539473, R539474, R539524, R539549, R539552, R539560, R539561, R539562, R539574, R539627, R539645, R539657, R539715, R539726, R539735, R539736, R539750, R539752, R539754, R539769, R539835, R539977, R539992, R540102, R540170, R540191, R540197, R540202, R540208, R540216, R540411, R540418, R540426, R540427, R540460, R540476, R540484, R540486, R540490, R540493, R540651, R540745, R540751, R540752, R540795, R540806, R540819, R540821, R540832, R540833, R540836, R540850, R540851, R540854, R540855, R540856, R540857, R540860, R540866, R540901, R540918, R540920, R540931, R540958, R541066, R541067, R541068, R541072, R541075, R541132, R541204, R541222, R541281, R541295, R541303, R541353, R541419, R541420, R541421, R541519, R541550, R541551, R541589, R541609, R541761, R541837, R541920, R541995, R541998, R542001, R542048, R542164, R542165, R542273, R542474, R542481, R542552, R542593, R542594, R542694, R543137, R543146, R543148, R543151, R543351, R543361, R543373, R543483, R543484, R543684, R543685, R543930, R543931, R544159, M527051, M527192, M527194, M527202, M527203, M527236, M527289, M527498, M527552.

6.2 Vedlegg 2

Kartet viser den geografiske fordelingen av observasjonene som danner grunnlaget for bestandsestimatene hos gaupe i 2020/2021.



Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

Rovdata er en enhet i Norsk institutt for naturforskning.

ISSN:1504-3312
ISBN: 978-82-426-4948-5

Omslagsfoto: Lars Krempbig, John Linnell, Roy Andersen,
Per Jordhøy, Espen Lie Dahl.

Norsk institutt for naturforskning

NINA Hovedkontor

Postadresse: Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00, Telefaks: 73 80 14 01

E-post: firmapost@nina.no

Organisasjonsnummer 9500 37 687

<http://www.nina.no>



Samarbeid og kunnskap for framtidens miljøløsninger