

2211

NINA Rapport



## Overvaking av kongeørn i Noreg 2022

Resultat frå 12 intensivt overvaka område

Jenny Mattisson  
Oddmund Kleven

# NINAs publikasjoner

## **NINA Rapport**

Dette NINAs normale rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsknings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig.

## **NINA Temahefte**

Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport.

## **NINA Fakta**

Faktaarkene har som mål å gjøre NINAs forskningsresultater raskt og enkelt tilgjengelig for et større publikum. De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste forskningstema.

## **Annен publisering**

I tillegg til rapporteringen i NINAs egne serier publiserer instituttets ansatte en stor del av sine vitenskapelige resultater i internasjonale journaler, populærfaglige bøker og tidsskrifter.

# Overvaking av kongeørn i Noreg 2022

Resultat frå 12 intensivt overvaka område

Jenny Mattisson  
Oddmund Kleven

Mattisson, J. & Kleven, O. 2022. Overvaking av kongeørn i Noreg  
2022. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport  
2211. Norsk institutt for naturforskning.

Trondheim, desember 2022

ISSN: 1504-3312  
ISBN: 978-82-426-5006-1

RETTIGHEITSHAVER  
© Norsk institutt for naturforskning  
Publikasjonen kan siterast fritt med kjeldeoppføring

TILGJENGELIGHEIT  
Open

PUBLISERINGSTYPE  
Digitalt dokument (pdf)

KVALITETSSIKRA AV  
Mari Tovmo

ANSVARLEG SIGNATUR  
Jonas Kindberg (sign.)

OPPDAGSGJEVAR  
Miljødirektoratet

OPPDAGSGJEVARS REFERANSE  
M-2397|2022

KONTAKTPERSON HJÅ OPPDAGSGJEVAR  
Susanne Hanssen

NØKKELORD

- Kongeørn
- *Aquila chrysaetos*
- bestandsovervaking
- DNA-analyse

KEY WORDS

- Golden Eagle
- *Aquila chrysaetos*
- population monitoring
- DNA analysis

KONTAKTOPPLYSNINGER

NINA hovedkontor	NINA Oslo	NINA Tromsø	NINA Lillehammer	NINA Bergen
Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim Tlf: 73 80 14 00	Sognsveien 68 0855 Oslo Tlf: 73 80 14 00	Postboks 6606 Langnes 9296 Tromsø Tlf: 77 75 04 00	Vormstuguvegen 40 2624 Lillehammer Tlf: 73 80 14 00	Thormøhlensgate 55 5006 Bergen Tlf: 73 80 14 00

[www.nina.no](http://www.nina.no)

## Samandrag

Mattisson, J. & Kleven, O. 2022. Overvaking av kongeørn i Noreg 2022. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport 2211. Norsk institutt for naturforskning.

Overvaking av kongeørn (*Aquila chrysaetos*) inngår i det nasjonale overvakingsprogrammet for rovvilt, og er organisert i to hovuddelar; intensiv og ekstensiv overvaking. I denne rapporten vert resultata for dei intensivt overvaka områda i 2022 presentert, både med tanke på territoriestatus, ungeproduksjon og DNA-analysar, saman med estimat på årleg vaksenoverleving frå Fauske og Finnmarksvidda. Vi vil òg samanlikne resultata med ungeproduksjonen i desse områda tidlegare år.

I den ekstensive overvakainga av arten vert noverande og tidlegare hekkterritorium over heile landet kartlagt. Hovudføremålet med denne kartlegginga er å få ei mest mogleg komplett oversikt over talet på hekkande par og den geografiske fordelinga av hekkterritorium i Noreg. Resultat frå den ekstensive overvakainga er ikkje inkludert i denne rapporten.

Den intensive overvakainga av kongeørn vert gjennomført i 12 utvalte intensivområde. Desse områda er valt for å få ei god dekning av landet i både nord-sør- og kyst-innlandsgradienten. I kvart av intensivområda er det 15 faste territorium, som vert følgde opp med fleire årlege besøk for å kartleggje hekkestatus i territoriet og ungeproduksjon. I to intensivområde vert det i tillegg samla inn DNA-materiale frå territoria for å overvake eventuelle endringar i den årlege vaksenoverlevinga. Seks av intensivområda har vore overvaka sidan 1990-talet gjennom Program for terrestrisk naturovervaking (TOV).

Resultata frå årets intensive overvaking av kongeørn viser at det i 2022 vart registrert 50 vellykka hekkingar med totalt 62 ungar eldre enn 50 døgn, og ein gjennomsnittleg produksjon per territorium på 0,34 ungar eldre enn 50 døgn. Dette er noko høgare enn i 2021, med 53 ungar eldre enn 50 døgn fordelt på 47 vellykka hekkingar, og ein gjennomsnittleg produksjon per territorium på 0,29 ungar eldre enn 50 døgn.

I områda inkludert i TOV, som har vore overvaka sidan 1992, vart det i 2022 produsert i gjennomsnitt 0,32 ungar per territorium. I perioden 1992–2022 vart det produsert i gjennomsnitt 0,40 (95 % KI: 0,35–0,44) ungar per territorium per år i TOV-områda, medan ein lineær modell synte ein signifikant nedgang i den berekna gjennomsnittlege årlege produksjonen. Gjennom perioden berekna modellen ein nedgang på 45 %, frå 0,51 ungar per territorium (95 % KI: 0,43–0,60) i 1992 til 0,28 (95 % KI: 0,20–0,37) i 2022.

DNA-analysar av mytefjør og prøver frå ungar påviste i 2022 18 ulike vaksne individ (7 hannar og 11 hoer) i intensivområdet Finnmarksvidda og 20 ulike vaksne individ (9 hannar og 11 hoer) i intensivområdet Fauske, mot høvesvis 12 og 13 ulike individ påvist i 2021.

Årleg overleving for vaksen kongeørn på Finnmarksvidda vart estimert til 0,89 (95 % KI: 0,84–0,92) i perioden 2012–2022. Årleg overleving for vaksen kongeørn i Fauske vart estimert til 0,86 (95 % KI: 0,77–0,91) i perioden 2015–2022. Det var ingen skilnad i estimert overleving mellom år eller kjønn korkje på Finnmarksvidda eller i Fauske.

Jenny Mattisson (jenny.mattisson@nina.no) & Oddmund Kleven (oddmund.kleven@nina.no), Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim.

## Abstract

Mattisson, J. & Kleven, O. 2022. Monitoring of Golden Eagle in Norway 2022. Results from 12 intensively monitored areas. NINA Report 2211. Norwegian Institute for Nature Research.

Monitoring of Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*) is a part of the National large predator monitoring program in Norway and is structured in two parts: intensive and extensive monitoring. In this report, we present results from the intensive monitoring in 2022 including status for the territories, production of fledglings, DNA-analysis, and an estimate of adult survival for Fauske and Finnmarksvidda. We also compare these results with previous years.

The goal of the extensive monitoring is to map existing and historical breeding territories across the country, contributing to a comprehensive overview of the number of breeding pairs and the geographical distribution of territories in Norway. Results from the extensive monitoring is not included in this report.

The intensive monitoring of Golden Eagles is distributed across 12 different monitoring areas. These areas are selected to cover both the north-south axis and the coast-inland gradient in Norway. In each area, 15 permanent territories are monitored on several occasions each year to document occupancy and production of fledglings. DNA-material from eagles is collected in two of the intensively monitored areas to detect potential changes in adult survival. Six of the intensively monitored areas have been monitored since the 1990s as part of a terrestrial monitoring program (TOV).

In 2022 we documented 50 successful breeding pairs with a total of 62 fledglings older than 50 days and an average production of 0.34 fledglings per territory. This is slightly higher than in 2021, with 47 successful breeding pairs with a total of 53 fledglings older than 50 days and an average production of 0.29 fledglings per territory.

In the TOV-areas, which have been monitored since 1992, the average production was 0.32 fledglings per territory in 2022. During 1992–2022, these areas produced an annual average of 0.40 (95 % CI: 0.35–0.44) fledglings per territory. A linear model showed a significant decreasing trend in predicted annual production of fledglings. Over the years the model estimated a 45 % decrease, from 0.51 (95 % CI: 0.43–0.60) fledglings per territory in 1992 to 0.28 (95 % CI: 0.20–0.37) in 2022.

DNA-analysis of moulted feathers and samples from offspring in 2022 identified 18 adult individuals (7 males and 11 females) in the intensively monitored area Finnmarksvidda and 20 adult individuals (9 males and 11 females) in the intensively monitored area Fauske, compared to 12, and 13, adult individuals in 2021.

Apparent annual adult survival of Golden Eagle at Finnmarksvidda was estimated to 0.89 (95 % CI: 0.84–0.92) in the period 2012–2022. Apparent annual adult survival of Golden Eagle at Fauske was estimated to 0.86 (95 % CI: 0.77–0.91) in the period 2015–2022. There was no difference in apparent annual adult survival among years or sex either at Finnmarksvidda or Fauske.

Mattisson (jenny.mattisson@nina.no) & Oddmund Kleven (oddmund.kleven@nina.no), Norwegian Institute for Nature Research, PO Box 5685 Torgarden, 7485 Trondheim.

# Innhold

<b>Samandrag .....</b>	<b>3</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>4</b>
<b>Innhold .....</b>	<b>5</b>
<b>Forord .....</b>	<b>6</b>
<b>1 Innleiing .....</b>	<b>7</b>
<b>2 Material og metode .....</b>	<b>9</b>
2.1 Hekkestatus og ungeproduksjon .....	9
2.2 Vaksenoverleving .....	11
2.2.1 Innsamling av DNA-prøvemateriale .....	11
2.2.2 DNA-analysar .....	11
2.2.3 Estimering av årleg vaksenoverleving .....	11
<b>3 Resultat .....</b>	<b>12</b>
3.1 Territoriestatus og ungeproduksjon .....	12
3.2 Vaksenoverleving .....	16
3.2.1 Analyserte prøver .....	16
3.2.2 Estimering av årleg vaksenoverleving .....	16
<b>4 Diskusjon .....</b>	<b>18</b>
<b>5 Referansar .....</b>	<b>20</b>
<b>6 Vedlegg .....</b>	<b>22</b>
6.1 Vedlegg 1 .....	22

## Forord

Vi vil takke alle dei som har lagt ned ein betydeleg innsats i overvakingsarbeidet på kongeørn. Det gjeld alle dei som har planlagt, koordinert og utført feltregistreringane i intensivområda, samt samla inn fjør og andre prøver for DNA-analyse.

Trondheim, desember 2022

Jenny Mattisson

# 1 Innleiing

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*) har ei vid geografisk utbreiing på heile den nordlege halvkule, og i Noreg finn vi den frå låglandet på kysten og opp til høgfjellet (Mattisson mfl. 2020). Føda er hovudsakeleg hønsefugl samt mellomstore pattedyr som hare, men den kan òg ta sau og rein. Åtsel kan òg vere ei viktig matkjelde, kanskje særleg på vinteren (Mattisson mfl. 2018, Nygård & Østerås 2014, Watson 2010). Vaksne kongeørner lever i par og forsvarar store territorium overfor andre kongeørner. Innanfor territoriet er det som oftast fleire alternative reirplassar som kan nyttast ulike år, og reiret ligg i ein fjellvegg/berghammar eller stort tre (Nygård & Østerås 2014, Watson 2010, Wiss 2008). Egglegging skjer i mars–april, og som oftast vert det lagt to egg. Etter vel 40 dagar rugeperiode vert eggna klekt, og 60–80 dagar seinare er ungane flygedyktige (Watson 2010). Kongeørn reknast som vare for forstyrringar i hekketida (Holmes mfl. 1993, Whitfield mfl. 2008).

Overvaking av kongeørnbestanden inngår i det nasjonale overvakingsprogrammet for rovvilt og er organisert i to hovuddelar; intensiv og ekstensiv overvaking. I den ekstensive overvakkinga kartleggast neverande og tidlegare hekketeritorium over heile landet. Hovudføremålet med denne kartlegginga er å få ei mest mogleg komplett oversikt over talet på hekkande par og den geografiske fordelinga av hekketeritorium i Noreg. Den ekstensive overvakkinga er mindre regelmessig enn den intensive overvakkinga, men vil gje viktig informasjon om endringar i bestandsstorleik, utbreiing og arealbruk. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har ansvar for den ekstensive delen av kongeørnovervakkinga, og metodikken som nyttast er beskrive i «Instruks for overvaking av kongeørn – B» (Rovdata 2015). Resultat frå den ekstensive overvakkinga er ikkje inkludert i denne rapporten.

Mattisson mfl. (2020) berekna kongeørnbestanden i Noreg til 1027 (95 % kredibilitetsintervall: 914–1145) hekkande par i perioden 2015–2019 basert på ein gjennomgang av data for kongeørnterritorium registrert i Rovbase. Usikkerheita i estimatet skuldast delvis at mange av dei kjente kongeørnterritoria ikkje var besøkt på lang tid, men òg at det er delar av landet der førekomensten av hekkande kongeørn kan vere mangelfullt kartlagt. Nilsen mfl. (2015) har gjennom modellering identifisert område i Noreg som har habitat eigna for kongeørn, men der det likevel ikkje er registrert kjente territorium i Rovbase. Det er ikkje mogleg å estimere sannsynet for førekomst av reir i desse områda, og dei bør kartleggast nærmare.

I den intensive overvakkinga vert kongeørn overvaka i 12 utvalde område. Desse områda er valt for å få ei god dekning av landet i både nord-sør- og kyst-innlandsgradienten. I kvart av intensivområda er det 15 faste territorium som vert følgde opp med fleire årlege besøk for å kartlegge hekkestatus i territoriet og ungeproduksjon. I to intensivområde vert det i tillegg samla inn DNA-materiale frå territoria for å overvake eventuelle endringar i den årlege vaksenoverlevinga. Ein hovudskilnad mellom den ekstensive og intensive overvakingsmetodikken er at med den intensive overvakkinga kan ein i tillegg sjå på utvikling av tomme territorium og territorium der kongeørna ikkje går til hekking («nullverdiar»), medan den ekstensive overvakkinga berre dokumenterer funn av hekking. Inkludering av «nullverdiar» gjer at det vert enklare å oppdage endringar i bestanden.

I tillegg til kunnskap om ungeproduksjon vil estimat på vaksenoverleving vere viktig for å kunne følgje endringar i bestanden (Katzner mfl. 2007, Nilsen mfl. 2015). DNA-basert overvaking er ein godt eigna metode for å få kunnskap om årleg overleving hjå kongeørn då arten lever lenge, nyttar det same territoriet i árevis og er sosialt monogam (Watson 2010). På same måte som andre ørneartar (sjå t.d. Rudnick mfl. 2005) er kongeørn sannsynlegvis seksuelt (genetisk) monogam, noko som gjer at DNA frå avkom kan nyttast for å påvise om foreldra er tidlegare kjente individ eller indikere utskifting av ein eller båe av dei hekkande individua i eit territorium. I tillegg er overvaking basert på DNA-analysar av mytefjør og blod-/fjørprøver frå reirungar meir kostnadseffektivt og skånsamt samanlikna med tradisjonell fangst og merking med satellitt/GPS-

sendar av vaksne individ. DNA-analysar har vore ein del av overvakinga av kongeørn i intensivområdet Finnmarksvidda sidan 2012 (Jacobsen mfl. 2022). Frå 2015 er det òg gjennomført systematisk innsamling av DNA i intensivområdet Fauske.

I denne rapporten vert resultata for dei intensivt overvaka områda i 2022 presentert, både med tanke på territoriestatus, ungeproduksjon og DNA-analysar, saman med estimat på årleg vaksenoverleving frå Fauske og Finnmarksvidda. Vi har òg samanlikna resultata med ungeproduksjonen i desse områda tidlegare år.


## 2 Material og metode

### 2.1 Hekkestatus og ungeproduksjon

Det er valt ut 12 intensivområde, kvar med 15 faste territorium innanfor eit geografisk område med om lag 50 km radius (**figur 1**). Den intensive overvakkinga vart starta opp i 2013 i elleve av dei tolv områda, medan overvakkinga i det tolvtte området (Aure) vart sett i gong i 2015. Seks av intensivområda (Børgefjell, Åmotsdalen, Gutulia, Møsvatn, Solhomfjell og Lund) er område som var inkludert i Program for terrestrisk naturovervakning (TOV), fram til det vart lagt ned etter 2020-sesongen, og har vore overvaka sidan 1990-talet. Overvakingsmetodikken som nyttast i dei intensivt overvaka områda er beskrive i «Instruks for overvakning av kongeørn – A» (Rovdata 2019), og tek utgangspunkt i metodikken som vart nytta i overvakkinga av kongeørn i TOV (Ekenstedt & Schneider 2008, Kålås mfl. 1991). Metodikken er basert på ein betydeleg feltinnsats, der alle territoria skal besøkast fleire gongar i løpet av registreringssesongen (1. februar–15. september). Besøk i territoria skal fordelast utover vår, sommar og haust, og ha minimum varigheit på totalt 8 timer dersom det underveis ikkje vert gjort positive funn som er knytt til eit reir i territoriet (t.d. pynta reir, rusing, mating, ungar mm.). Dersom det er observasjonar som kan tyde på at paret nyttar ein ny reirplass skal det leitast etter nye alternativreir. Etter registreringssesongen skal alle territoria ha fått ein endeleg status (vellykka hekking, hekkeforsøk påvist, hekkeforsøk ikkje påvist, inga hekking eller usikker hekking). For at ei hekking skal vurderast som vellykka må det vere observert ungar som er eldre enn 50 døgn («flygedyktige ungar»). Sjølv om ungane ikkje er flygedyktige før etter 60–80 dagar vert hekkinga rekna som vellykka, og ungane som flygedyktige, når 80 % av flygedyktig alder er oppnådd (Steenhof 1987). I TOV har 50 døgn tidlegare vorte nytta som kriterium for vellykka hekking, og vi nyttar det same for å kunne samanlikne resultata med dei lange tidsseriane i TOV-områda. «Hekkeforsøk påvist» og «hekkeforsøk ikkje påvist» vert nytta som vurderingsstatus for okkuperte territorium utan vellykka hekking, medan ikkje okkuperte territorium får vurderingsstatus «inga hekking». Dersom territoriet ikkje er overvaka i samsvar med metodikken vurderast det som «usikker hekking».

For å oppdage eventuelle endringar i produksjon av ungar i perioden 1992–2022 nytta vi ein lineær modell (LMM) med unike TOV-område som tilfeldige skjæringspunkt for å ta omsyn til gjentakande observasjonar i same område.

Arbeidet i felt vert utført av ulike aktørar på oppdrag frå Miljødirektoratet. Besøk og observasjonar i territoriet i løpet av registreringssesongen vert registrert og lagra i Rovbase 3.0, saman med eventuelt dokumentasjonsgrunnlag i form av foto/film. Etter registreringssesongen vert alt materiale kvalitetssikra av Rovdata, og kvart territorium får ein endeleg vurderingsstatus.



**Figur 1.** Oversikt over kongeørnterritorium i dei 12 områda som inngår i intensivovervakkinga 2022. Den lyserauda sirkelen indikerer 50 km radius frå sentrum i intensivområdet.

## 2.2 Vaksenoverleving

### 2.2.1 Innsamling av DNA-prøvemateriale

I 2022 vart det samla inn DNA prøvemateriale frå to av intensivområda (Fauske og Finnmarksvidda, sjå **figur 1**). Forskingspersonell frå Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vore ansvarleg for å samla inn materiale frå Finnmarksvidda som ein del av eit pågåande forskingsprosjekt (Jacobsen mfl. 2022), medan Fjelltjenesten i Salten har vore ansvarleg for innsamling i Fauske.

Det vart leita etter mytefjør både i og under reir. Erfarne klatrarar (frå rovfuglgruppa i Vest-Finnmark og frå Bodø Alpine Redningsgruppe) hjelpte til med å hente mytefjør i reira og å hente eventuelle reirungar for prøvetaking og ringmerking. I tillegg vart kjente og potensielle sitteplassar/sittetre i nærliken av reiret (< 500 m unna) oppsøkt for å leite etter mytefjør. Mytefjør vart lagra tørt i papirkonvoluttar i romtemperatur, medan fjør frå ungar anten vart lagra tørt i papirkonvoluttar i romtemperatur eller i røyr med 96 % etanol. Alle innsamla prøver vart merkt med ein unik strekkode, og registrert i Rovbase 3.0 før innsending til analyse.

På Finnmarksvidda vart 12 av dei 15 territoria besøkt i slutten av juni for å samle prøver til DNA-analyse. Det vart funne og samla inn mytefjør i 11 av dei 12 besøkte territoria og det vart i tillegg nappa fjør frå fem reirungar. I eitt av dei besøkte territoria vart det ikkje funne noko materiale for DNA-analyse.

I Fauske vart 11 av dei 15 territoria besøkt i løpet av juni–august for å samle prøver til DNA-analyse. I alle dei 11 besøkte territoria vart det funne og samla inn mytefjør, og i sju av desse vart det i tillegg samla DNA (nappa fjør og klo frå ein daud reirunge) frå totalt åtte reirungar. I fire territorium vart det ikkje gjort noko forsøk på å leite etter og samle inn mytefjør.

### 2.2.2 DNA-analysar

DNA vart isolert med eit delvis automatisert system (KingFisher-instrument) med tilhøyrande protokoll, og analysert med eit markørsett bestående av 95 SNP-markørar og ein kjønnsmarkør (Kleven mfl. upubliserte data). Sannsynet for at to tilfeldige individ har identisk DNA-profil med dette markørsettet er svært låg ( $6,7 \times 10^{-37}$ ). Kvar DNA-prøve vart analysert i to uavhengige PCR-ar. Basert på dei to uavhengige PCR-ane frå kvar prøve vart ein konsensus-genotype konstruert og prøver der meir enn 70% av markørane fungerte, vart godkjent for individbestemming.


### 2.2.3 Estimering av årleg vaksenoverleving

Med data frå fleire år (tre eller fleire) kan ein estimere den årlege overlevinga til individua i eit område ved fangst-attfangst-modellar. Cormack-Jolly-Seber-modellar i programmet MARK (White & Burnham 1999) vart nytta til estimering av deteksjon og overleving mellom år hjå vaksne kongeørner. Modellar med skilnader i oppdagbarheit og overleving mellom år og kjønn vart testa opp mot tids- og kjønnsuavhengige modellar. Modellseleksjon basert på AIC (Akaike's informasjonskriterie) vart nytta for å finne fram til den beste modellen (sjå t.d. Johnson & Omland 2004 for nærmare beskriving av AIC-basert modellseleksjon).


## 3 Resultat

### 3.1 Territoriestatus og ungeproduksjon

Resultata frå årets intensive overvakning av kongeørn viser at det samla sett vart registrert 50 vellykka hekkingar med totalt 62 ungar med alder > 50 døgn (**figur 2 og 3, tabell 1**). Det vart påvist hekkeforsøk i ytterlegare 32 territorium. I 88 territorium vart det ikkje påvist hekkeforsøk, og 25 av desse vart vurdert som tomme territorium i 2022 (ikkje okkupert av kongeørnpar). Ti territorium vart vurdert som usikker hekking, grunna at overvakkinga ikkje var gjennomført etter metodikken, i fire av desse var det observert ruging. I 2022 vart det i fem av dei tolv områda registrert seks vellykka hekkingar, med produksjon av 6–9 ungar > 50 døgn per område. Færrest vellykka hekkingar vart det registrert i Møsvatn, med 1 unge (> 50 døgn) i 1 territorium, og Solhomfjell, utan registrerte vellykka hekkingar.




**Figur 2.** Fordeling av endelig territoriestatus i dei 180 intensivt overvaka territoria i 2022. I fire av dei 10 territoria med usikker hekking, var det observert ruging (skravert).



**Figur 3.** Kart som viser fordeling av vellykka hekking (territorium med produksjon av ungar > 50 døgn) i intensivområda i perioden 2020–2022.

I 2022 vart det produsert i gjennomsnitt 0,34 (95 % KI: 0,24–0,45) ungar (> 50 døgn) per territorium i intensivområda, medan det i 2021 var ein gjennomsnittleg produksjon på 0,29 (95 % KI: 0,21–0,38) ungar (> 50 døgn) per territorium (tabell 1, figur 4). Den høgaste produksjonen per territorium vart registrert i Åmotsdalen og Dividalen, med ein gjennomsnittleg produksjon på 0,60 ungar > 50 døgn per territorium. Det var òg i 2022 mange intensivområde med låg produksjon, og ein gjennomsnittleg produksjon på 0,2 eller færre ungar (> 50 døgn) per territorium vart registrert i fire av intensivområda (Solholmfjell, Møsvatn, Aure og Ringvassøya). I Solholmfjell var det ikkje registrert vellykka hekking.




**Figur 4.** Produksjon av flygedyktige ungar (> 50 døgn) per territorium i intensivområda i perioden 2020–2022.


**Tabell 1.** Fordeling av territorium med vellykka hekking og produksjon av ungar (> 50 døgn) totalt og per territorium i intensivområda i perioden 2020–2022. Produksjon av ungar per territorium = antal ungar / antal overvaka territorium i intensivområdet. Område markert med grå indikerer at intensivområdet var inkludert i TOV.

Intensiv-område	2020			2021			2022		
	Antal vellykka	Antal ungar	Ungar per terr	Antal vellykka	Antal ungar	Ungar per terr	Antal vellykka	Antal ungar	Ungar per terr
Lund	6	6	0,40	6	6	0,40	6	6	0,40
Solhomfjell	2	2	0,13	5	5	0,33	0	0	0,00
Møsvatn	1	2	0,13	5	8	0,53	1	1	0,07
Voss	2	3	0,20	7	8	0,53	4	5	0,33
Gutulia	4	5	0,33	5	5	0,33	5	7	0,47
Åmotsdalen	4	5	0,33	3	4	0,27	6	9	0,60
Aure	2	2	0,13	4	5	0,33	3	3	0,20
Børgefjell	4	6	0,40	4	4	0,27	6	6	0,40
Fauske	4	5	0,33	2	2	0,13	6	7	0,47
Dividalen	1	1	0,07	3	3	0,20	5	9	0,60
Ringvassøy	4	4	0,27	1	1	0,07	2	3	0,20
Finnmarksv.	6	6	0,40	2	2	0,13	6	6	0,40
<b>Sum</b>	<b>40</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>53</b>		<b>50</b>	<b>62</b>	
<b>Gjennomsnitt</b>			<b>0,26</b>			<b>0,29</b>			<b>0,34</b>

I områda inkludert i TOV vart det i 2022 produsert i gjennomsnitt 0,32 ungar per territorium. **Figur 5** viser årleg produksjon av ungar per territorium i dei ulike TOV-områda. I perioden 1992–2022 er det produsert i gjennomsnitt 0,40 (95 % KI: 0,35–0,44) ungar per territorium per år i TOV-områda, medan modellen syner ein signifikant nedgang i den berekna gjennomsnittlege årlege produksjonen (**figur 6**;  $\beta=-0,008$ ,  $SE=0,002$ ,  $p<0,001$ ). Gjennom perioden representerer dette ein nedgang på 45 %, frå 0,51 (95 % KI: 0,43–0,60) i 1992 til 0,28 (95 % KI: 0,20–0,37) i 2022.



**Figur 5.** Produksjon av ungar per territorium i dei ulike TOV-områda i perioden 1992–2022.



**Figur 6.** Produksjon av ungar i TOV-områda i perioden 1992–2022 med 95% konfidensintervall på berekna gjennomsnittsverdi (grøn linje). Dei svarte prikkane syner gjennomsnittlig produksjon i TOV-områda per år medan den grå streken er gjennomsnittleg årleg produksjon for heile perioden 1992–2022.

## 3.2 Vaksenoverleving

### 3.2.1 Analyserte prøver

Av totalt 82 analyserte mytefjør resulterte 95 % (78 av 82) i ein DNA-profil. Suksessrata var 100 % for nappa fjør ( $n=10$ ) og klo ( $n=1$ ).

Dei 78 mytefjøra med godkjent DNA-profil representerte 28 ulike vaksne individ, 23 hoer og 5 hannar. Kjønnsfordelinga for dei to områda var 79 % hoer (11 av 14) på Finnmarksvidda og 86 % hoer (12 av 14) i Fauske.

Basert på DNA-analysar av mytefjør og prøver frå ungar vart det påvist totalt 18 ulike vaksne individ (7 hannar, 11 hoer) i intensivområdet Finnmarksvidda i 2022. Alle 18 individua var påvist tidlegare år basert på DNA-analysar. Ein hann hadde tidlegare ikkje vore påvist som vaksen ( $> 1$  år), men var allereie registrert i DNA-databasen gjennom DNA-prøve frå pullus i 2018 i samband med den DNA-baserte overvakkinga som NINA gjennomfører i ekstensive territorium i nærleiken av de 15 intensive territoria på Finnmarksvidda. I sju av dei tolv territoria der det vart skaffa til vege minst ein DNA-profil vart både ein hann og ei ho påvist, medan i fire territorium vart berre hoa påvist. I tre territorium vart det påvist utskifting av eitt individ (hannen i to territorium og hoa i eitt territorium).

Basert på DNA-analysar av mytefjør og prøver frå ungar vart det påvist totalt 20 ulike vaksne individ (9 hannar, 11 hoer) i intensivområdet Fauske i 2022. Fjorten av desse individua var påvist tidlegare år basert på DNA-analysar. I ni av dei elleve territoria der det vart skaffa til vege minst ein DNA-profil vart både ein hann og ei ho påvist, medan i to territorium vart berre hoa påvist. I tre territorium vart det påvist utskifting av eitt individ (hannen i eitt territorium og hoa i to territorium).

### 3.2.2 Estimering av årleg vaksenoverleving

Basert på data for elleve år (2012–2022) vart årleg overleving estimert til 0,89 (95 % KI: 0,84–0,92) for vaksne kongeørner på Finnmarksvidda. I den beste modellen var overleving konstant frå år til år og lik for både kjønn, medan det var større sannsyn for å påvise hoer (0,83; 95 % KI: 0,74–0,89) enn hannar (0,61; 95 % KI: 0,50–0,71). Data gav tilsvarende god støtte (delta AICc<2) til ytterlegare ein modell med tids- og kjønnsvariasjon som vart testa, men for å vere

konservativ er det her valt å nytte den minst komplekse modellen for å forklare den observerte årlege oppdagbarheita og overlevinga hjå vaksne kongeørner i intensivområdet på Finnmarks-vidda.

Basert på data for åtte år (2015–2022) vart årleg overleving estimert til 0,86 (95 % KI: 0,77–0,91) for vaksne kongeørner i intensivområdet Fauske. I den beste modellen var overleving konstant frå år til år og lik for både kjønn, medan det var større sannsyn for å påvise hoer (0,73; 95 % KI: 0,59–0,84) enn hannar (0,52; 95 % KI: 0,35–0,68). Data gav tilsvarende god støtte (delta AICc<2) til ytterlegare to modellar med tids- og kjønnsvariasjon som vart testa, men for å vere konservativ er det her valt å nytte den minst komplekse modellen for å forklare den observerte årlege oppdagbarheita og overlevinga hjå vaksne kongeørner i intensivområdet Fauske.

## 4 Diskusjon

I 2022 vart det produsert 62 ungar (> 50 døgn) i dei intensivt overvaka områda, med eit gjennomsnitt på 0,34 ungar per territorium, medan det i 2021 var ein gjennomsnittleg produksjon på 0,29 ungar per territorium (Tovmo mfl. 2021). Skilnaden mellom dei ulike intensivområda er i år større enn i fjar, med ein produksjon i dei beste og dårligaste områda på høvesvis 0,60 og 0 ungar (> 50 døgn) per territorium. I år er Åmotsdalen eit av områda med høgast produksjon. Det er 29 år sidan sist det var registrert så høg produksjon i Åmotsdalen (**figur 5**). Det var svært dårlig produksjon i to av dei sørlege områda, Solhomfjell og Møsvatnet, medan det tredje sørlege området, Lund, har hatt stabil produksjon dei tre siste åra. I Solhomfjell og Møsvatnet er det heller ikkje påvist meir enn fire hekkeforsøk totalt, i tillegg til den eine vellykka hekkinga. Dette kan tyde på dårlige tilhøve tidleg i hekkesesongen. Det er òg i år, som i 2021, observert at ein stor del av para i dei to områda i Troms (Dividalen og Ringvassøya) gjekk til hekking, med påvist hekkeforsøk i 9 territorium i kvart område i tillegg til territoria med vellykka hekking. Dette kan tyde på at det var gode tilhøve tidleg på året, men at dette endra seg utover sesongen. Ein studie frå Skottland viser ein gjennomsnittleg produksjon i tre ulike studieområde med høg, middels og låg mattilgang på høvesvis 0,8, 0,6 og 0,33 utflydde ungar per okkupert territorium (Watson 2010). Denne studien frå Skottland er ikkje direkte samanliknbar med dei norske resultata, då den berre ser på okkuperte territorium og reknar utflydde ungar først når dei er om lag 70 døgn gamle.

Den lange tidsserien frå TOV-områda gjer at vi kan sjå på trendar over tid, og ein lineær modell syner at det har vore ein signifikant nedgang i tal på ungar per territorium i perioden 1992–2022 sjølv om det er stor variasjon både mellom år og område. Kva denne nedgangen kjem av er ukjent. Det er mange faktorar som kan påverke hekkesuksessen for kongeørn. God tilgang på byttedyr av passande storleik både før og under hekkeperioden kan vere avgjeraende både for om kongeørna går til hekking eller ikkje, og for resultatet av hekkinga (Watson 2010). Vêr og temperatur i hekkeperioden kan òg vere viktig for hekkesuksessen. Kraftig snøfall etter at rugeperioden har starta, og blåte og kalde vårar kan påverke hekkesuksessen negativt (Nygård & Østerås 2014). Dette kan verte særleg kritisk ved auka frekvens av ekstremvêr grunna klimaendringar (Marcelino mfl. 2020), med store svingingar i temperatur utover våren. I Finnmark fann ein ingen klar samanheng mellom snøfall og gjennomsnittleg tal på ungar, sjølv om tidspunkt for snøfall kan påverke om hekkinga vert avbrote eller ikkje (Jacobsen mfl. 2015). Aukande grad av forstyrring kan òg vere ein medverkande årsak til nedgangen. Førebels manglar vi kunnskap om kva faktorar som kan ha størst påverknad.

Overvakning av kongeørn i intensivområda har relativt lita usikkerheit knytt til talet på vellykka hekkingar, då alle kjente reir skal kontrollerast og ungane er knytt til berre eitt reir per sesong. Ein observasjon av ungar eldre enn 50 døgn, som krevst for å vurdere ei hekking som vellykka, har liten fare for å feilaktig blandast med andre territorium sidan ungane er knytt til fødselsterritoriet til utpå hausten (Jacobsen mfl. 2014). Det er framleis usikkerheit knytt til eventuelle hekkingar ein kan ha gått glipp av grunna at ukjente eller nye reirplassar vert nytta. Metodikken er tilpassa å fange opp slike eventuelle hekkingar som skjer i ukjente reir. Dette ved at ein på hausten skal gjennomføre eit besøk for å sjå etter utflydde ungar i dei territoria der ein i løpet av registreringsperioden ikkje har fått avklart statusen. I 2022 var det to tilfelle der første positive observasjon i territoriet var av flygedyktige ungar på hausten. Besøk på hausten vil likevel ikkje fange opp om det er hekkeforsøk i eit ukjent reir der ungane ikkje når flygedyktig alder. Dei presenterte tala er såleis eit minimumstal på vellykka hekkingar, men med relativt låg usikkerheit etter våre vurderingar.

I 2022 fekk 25 territorium statusen «inga hekking», dvs. territoriet har ikkje vore okkupert av territoriehevdande kongeørn. Alle desse territoria har vore kontrollert meir enn minimumskravet i instruksen (8 timer), med gjennomsnittleg tidsbruk per territorium på 13 timer. Vi veit ikkje om dette er territorium som faktisk ikkje er okkuperte, eller om det er eit resultat av at fuglane kan vere lite synlege i år utan hekkeforsøk.

Kongeørn er store fuglar som er forventa å leve lenge og dermed ha stort sannsyn for å overleve frå eitt år til det neste. Årleg overleving for vaksen kongeørn på Finnmarksvidda og Fauske vart estimert til høvesvis 0,89 og 0,86. Det var ikkje noko bevis for ein skilnad mellom år eller kjønn i overleving hjå vaksen kongeørn i desse to områda. Desse estimata på årleg vaksenoverleving er litt lågare jamfört med tidlegare publiserte estimat frå populasjonar i Storbritannia og Tyskland (0,91–0,98, Watson 2010), og det som vart nytta for å estimere bestandsstrukturen for kongeørn i Noreg (0,93 (0,90–0,96), Nilsen mfl. 2015). Andelen territoriehevdande individ i bestanden er påverka av dei demografiske verdiane, og særleg har overleving av vaksne individ stor effekt på strukturen i bestanden. Kor representative estimane på vaksenoverleving frå Finnmarksvidda og Fauske er for andre delar av landet er uvisst. Det vil difor vere viktig å skaffe tilsvarande data frå andre område for å undersøkje om det er skilnader i overleving mellom ulike område av landet. Slike skilnader mellom ulike område kan indikere systematiske skilnader i faktorar som påverkar overleving som t.d. mattilgang og menneskeskapt dødelegheit (t.d. frå kollisjonar med installasjonar eller illegal jakt).

## 5 Referansar

- Ekenstedt, J. & Schneider, M. (red.) 2008. The golden eagle (*Aquila chrysaetos*) in the North Calotte area 1990-2007. Naturvårdsverket.
- Holmes, T.L., Knight, R.L., Stegall, L. & Craig, G.R. 1993. RESPONSES OF WINTERING GRASSLAND RAPTORS TO HUMAN DISTURBANCE. *Wildlife Society Bulletin* 21(4): 461-468.
- Jacobsen, K.-O., Nygård, T., Johnsen, T.V., Kleven, O., Stien, A., Systad, G.H. & Halley, D. 2022. Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021. Oppsummering av resultatene fra et langtidsstudium. NINA Rapport 2107. Norsk institutt for naturforskning.  
<https://hdl.handle.net/11250/2988193>
- Jacobsen, K.O., Stien, A., Nygård, T., Kleven, O., Mabille, G., Johnsen, T.V., Opgård, O., Østlyngen, A., Johansen, K. & Myklevoll, V. 2014. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2013. NINA Rapport 1023. Norsk institutt for naturforskning.  
<http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1023.pdf>
- Jacobsen, K.O., Stien, A. & Kleven, O. 2015. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2014. NINA Rapport 1144. Norsk institutt for naturforskning.  
<http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1144.pdf>
- Johnson, J.B. & Omland, K.S. 2004. Model selection in ecology and evolution. *Trends in Ecology & Evolution* 19(2): 101-108. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2003.10.013>
- Katzner, T., Milner-Gulland, E.J. & Bragin, E. 2007. Using modeling to improve monitoring of structured populations: Are we collecting the right data? *Conservation Biology* 21(1): 241-252. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00561.x
- Kålås, J.A., Framstad, E., Fiske, P., Nygård, T. & Pedersen, H.C. 1991. Terrestrisk naturovervåking. Metodemanual, smågnagere og fugler. NINA Oppdragsmelding 75. Norsk institutt for naturforskning.  
<https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/075.pdf>
- Marcelino, J., Silva, J.P., Gameiro, J., Silva, A., Rego, F.C., Moreira, F. & Catry, I. 2020. Extreme events are more likely to affect the breeding success of lesser kestrels than average climate change. *Scientific Reports* 10(1): 7207. doi:10.1038/s41598-020-64087-0
- Mattisson, J., Jacobsen, K.O. & Kjørstad, M. 2018. Kungsörn, havsörn och tamren - En kunnskapssammanställning. NINA Rapport 1368. Norsk institutt for naturforskning.  
<http://hdl.handle.net/11250/2443928>
- Mattisson, J., Nilsen, E.B. & Brøseth, H. 2020. Estimering av antall hekkende par kongeørn basert på kjent forekomst i Norge for perioden 2015-2019. NINA Rapport 1858. Norsk institutt for naturforskning. <https://hdl.handle.net/11250/2689308>
- Nilsen, E.B., Mattisson, J., Nygård, T. & Hamre, Ø. 2015. Kongeørn: Bestands- og habitatmodellering. NINA Minirapport 570. Norsk institutt for naturforskning.  
[https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NINA\\_minirapport\\_570%20\(secured\).pdf](https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Rapporter/NINA_minirapport_570%20(secured).pdf)
- Nygård, T. & Østerås, T.R. 2014. Kongeørn i Nord-Trøndelag 2009-2013. NINA Rapport 1011. Norsk institutt for naturforskning. <http://hdl.handle.net/11250/2372322>
- Rovdata. 2015. Instruks for overvåking av kongeørn - B. Landsdekkende kartlegging (ekstensiv overvåking). Rovdata.

<https://rovdata.no/LinkClick.aspx?fileticket=4iLoTBdGyzQ%3d&tabid=5773&portalid=52&mid=4941&forcedownload=true&forcedownload=true%22>

Rovdata. 2019. Instruks for overvåking av kongeørn -A. Overvåking av kongeørn i intensivområder. Rovdata, Trondheim.  
[https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Instrukser/A\\_intensiv%20overv%C3%A5king%20av%20konge%C3%B8rn\\_revidert\\_20191203.pdf?ver=FzdtKeu4gOLviBujUtcew%3d%3d](https://rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Instrukser/A_intensiv%20overv%C3%A5king%20av%20konge%C3%B8rn_revidert_20191203.pdf?ver=FzdtKeu4gOLviBujUtcew%3d%3d).

Rudnick, J.A., Katzner, T.E., Bragin, E.A., Rhodes, O.E. & Dewoody, J.A. 2005. Using naturally shed feathers for individual identification, genetic parentage analyses, and population monitoring in an endangered Eastern imperial eagle (*Aquila heliaca*) population from Kazakhstan. *Molecular Ecology* 14(10): 2959-2967. doi:10.1111/j.1365-294X.2005.02641.x

Steenhof, K. 1987. Assessing raptor reproductive success and productivity. National Wildlife Federation Scientific and Technical Series: 157-170.

Tovmo, M., Mattisson, J. & Kleven, O. 2021. Overvaking av kongeørn i Noreg 2021. Resultat fra 12 intensivt overvaka område. NINA Rapport 2052. Norsk institutt for naturforskning.  
<https://hdl.handle.net/11250/2834336>

Watson, J. 2010. The golden eagle. 2nd. utg. T. & A.D. Poyser, London, UK.

White, G.C. & Burnham, K.P. 1999. Program MARK: Survival estimation from populations of marked animals. *Bird Study* 46 Supplement: 120-148.


Whitfield, D.P., Ruddock, M. & Bullman, R. 2008. Expert opinion as a tool for quantifying bird tolerance to human disturbance. *Biological Conservation* 141(11): 2708-2717.  
doi:10.1016/j.biocon.2008.08.007

Wiss, L.-E. 2008. Breeding habitat and nest site selection of the golden eagle *Aquila chrysaetos* (L.) in Gotland. *Ornis Svecica* 18(2): 108-113. doi:10.34080/os.v18.22672

## 6 Vedlegg

### 6.1 Vedlegg 1

Produksjon av flygedyktige ungar (> 50 døgn) per territorium i intensivområda i perioden 2013–2022. I 2013 var ikke alle ungar over 50 døgn ved siste reirsjekk i Divedalen og Finnmarksvidda. Aure vart ikkje sett i drift før i 2015.





*Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall  
for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til  
forvaltning, media og publikum.*

*Rovdata er en enhet i Norsk institutt for naturforskning.*

Omslagsfoto: Lars Krempig, John Linnell, Roy Andersen,  
Per Jordahl, Espen Lie Dahl.

ISSN:1504-3312  
ISBN: 978-82-426-5006-1

## Norsk institutt for naturforskning

NINA Hovedkontor

Postadresse: Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00, Telefaks: 73 80 14 01

E-post: [firmapost@nina.no](mailto:firmapost@nina.no)

Organisasjonsnummer 9500 37 687

<http://www.nina.no>



Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger